



醫護專業人員 2019 冠狀病毒病疫苗篩檢表資訊

已更新：2021 年 3 月 5 日

注意：如需瞭解相關的疫苗禁忌症與注意事項，請前往 www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/contraindications.html 查看免疫實踐諮詢委員會 (Advisory Committee for Immunization Practices, ACIP) 制定的最佳免疫實踐通用指南。

1. 您今天感覺不舒服嗎？

如不舒服，請告知疫苗接種站點的醫療保健提供者，評估目前的健康狀況。如果患者出現中度或嚴重的不適症狀，則目前不適合接種疫苗。請患者在症狀緩解後再回來接種。

2. 在過去的 10 天裡，您是否因出現症狀而接受 2019 冠狀病毒病檢測且還在等待測試結果，是否因感染、接觸 2019 冠狀病毒病或出行而被醫療服務提供者或衛生部門告知在家隔離或檢疫？

如果是，則建議患者回家隔離或檢疫，待隔離/檢疫結束時再重新安排時間。

如果患者確診 2019 冠狀病毒病的時間是 10 天前，且症狀已經消失 72 小時或以上，則能夠接種疫苗。

如果患者在過去 10 天曾進行病毒檢測，則請患者出示測試結果。如測試結果為陽性，則請患者回家。如為陰性，則能接種疫苗。如未確診或未知測試結果，則請患者待到確認結果為陰性或在確診陽性結果的 10 天後再回來接種。

3. 在過去 90 天（3 個月）內，您是否接受過 2019 冠狀病毒病抗體治療或恢復期血漿治療？如果是，你最後一次用藥是什麼時候？

如果是，請在最後一次抗體治療的至少 90 天後再重新安排接種。

4. 你曾經對任何疫苗、針劑注射、疫苗注射或 2019 冠狀病毒病疫苗的任何成分產生過立即的過敏反應（例如蕁麻疹、面部腫脹、呼吸困難或過敏症）或對任何成分有嚴重過敏反應（過敏症）？

如有過敏，請告知疫苗接種站點的醫療保健提供者，評估目前的過敏反應。

如需瞭解成分清單，請瀏覽 <https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Appendix-C>

2019 冠狀病毒病疫苗接種禁忌症：

- 對 2019 冠狀病毒病疫苗或疫苗的任何成分產生嚴重過敏反應（過敏症）或立即的過敏反應
- 曾對任一 mRNA 2019 冠狀病毒病疫苗產生過敏反應的個人不可再接種任何一種 mRNA 2019 冠狀病毒病疫苗（輝瑞公司 (Pfizer) 或摩德納公司 (Moderna)）

2019 冠狀病毒病疫苗接種注意事項：（請參閱所在組織的規定，查看接種時有注意事項的個人是否需要進一步評估。）

- 對任何其他疫苗或注射療法（即肌肉注射、靜脈注射或皮下注射疫苗或療法，但不包括針對過敏的皮下免疫療法）產生立即的過敏反應
- 對任何一種 2019 冠狀病毒病疫苗（如 mRNA）有禁忌症的個人在接種其他疫苗時也需採取同樣的防範措施（如楊森製藥 (Janssen) 的病毒載體）
 - 需要時可與過敏免疫專家協商，幫助確定患者接種疫苗是否安全，同時，為此等患者接種疫苗時需在合適的診所中實施，並由有嚴重過敏反應管理經驗的醫護提供者監督。
 - **注意：**此等人員不得在州營疫苗接種站點接種 2019 冠狀病毒病疫苗。

經過敏史評估後符合資格接種 2019 冠狀病毒病疫苗的患者接種疫苗之後需要觀察 30 分鐘，具體如下：

- 曾對任何其他疫苗或注射療法產生任何程度的立即過敏反應的患者
- 患有其他 2019 冠狀病毒病疫苗（如 mRNA 和楊森病毒載體）禁忌症的患者
- 由於任何原因曾出現過敏症的患者

5. 你在過去 14 天（2 周）是否注射了疫苗，包括流感疫苗？如果是，你最近一次接種疫苗是多久以前？

如果是，請在最近一次接種的至少 14 天後再重新安排接種。

6. 你懷孕了或者正在考慮懷孕？

如果是，詢問患者是否想要向站點的醫護提供者諮詢，瞭解妊娠期接種 2019 冠狀病毒病疫苗的利弊。患者如認為無需進行醫療評估，也可自行選擇接種疫苗。

7. 你是否患有癌症、白血病、愛滋病毒/愛滋病、自身免疫性疾病或其他任何削弱免疫系統的疾病？

如果是，請向接種站點的醫護提供者諮詢，討論 2019 冠狀病毒病疫苗與免疫功能不全人士相關的已知或未知事項。也可告知患者，如果他們免疫功能不全或正服用影響免疫系統的藥物，則其免疫系統對於疫苗的反應可能較低，但仍然可以接種疫苗。此等患者仍應繼續遵循現有指引，保護自己免受 2019 冠狀病毒病的感染。

8. 您是否服用過影響免疫系統的藥物，例如可的松、強的松或其他類固醇、抗癌藥物，或接受過放療？

如果是，請向接種站點的醫護提供者諮詢，討論 2019 冠狀病毒病疫苗與免疫抑制人士相關的已知或未知事項。也可告知患者，如果他們免疫功能不全或正服用影響免疫系統的藥物，則其免疫系統對於疫苗的反應可能較低，但仍然可以接種疫苗。此等患者仍應繼續遵循現有指引，保護自己免受 2019 冠狀病毒病的感染。

9. 你有出血性疾病嗎？或者在服用血液稀釋劑？

如果是，請向醫護提供者諮詢，評估患者的出血風險。如果可以接種，則在接種時使用 23G 或更小的針頭，並在接種之後緊壓接種部位至少 2 分鐘，不要摩擦接種部位。

10. 您以前接種過 2019 冠狀病毒病疫苗嗎？

如果是，請確認第二針 mRNA 2019 冠狀病毒病疫苗與第一針來自同一製造商，且第二針的接種時間符合間隔要求（輝瑞疫苗為第一針後的 21 天；摩德納疫苗則為第一針後的 28 天）。如果患者不記得上一針 2019 冠狀病毒病疫苗的廠商，則應查閱醫療記錄、紐約州免疫資訊系統 (New York State Immunization Information System, NYSIIS)、紐約市全市免疫登記系統 (Citywide Immunization Registry, CIR) 及疫苗接種登記卡，確認第一針的廠商。第二針 mRNA 2019 冠狀病毒病疫苗的接種時間應盡量符合推薦的間隔時間。楊森 2019 冠狀病毒病疫苗僅需接種一針。

州營疫苗接種站點：預約了楊森 2019 冠狀病毒病疫苗但之前曾接種過一針輝瑞或摩德納 2019 冠狀病毒病疫苗的人員不得接種楊森 2019 冠狀病毒病疫苗。

* 對任一篩檢問題回答「未知」的任何人員都應轉介至疫苗分發點或診所的醫療主管或負責的醫護提供者，以評估相關狀況。（如該人員可能看不懂相關問題，這時醫護提供者就需進一步解釋）。